

## Standard De Race Pecora Nera di Arbus



Les renseignements de suite reportés sont extrapolés par les standards de la race, inséré dans les Règles Techniques de la population ovine "Pecora Nera di Arbus", à l'intérieur du registre Maître des populations ovines et caprine autochtones à diffusion limitée; tenu par l'ASSO.NA.PA. [<http://www.assonapa.it>]

### 1) Origine et diffusion

D'origine autochtone, le mouton de race Pecora Nera di Arbus est présent dans la Région la Sardaigne, en quelques élevages en particulier localisés dans le Medio Campidano (Arburese) et en Ogliastra. On présume que quelques centaines de sujets puissent être déterminées en tout. Noyaux sont présents aussi en autres pays du bassin méditerranéen et en particulier dans les pays de l'Afrique du Nord. Pour ses capacités considérables d'acclimatation elle est présente dans les zones de colline et montes en bien il s'adaptant effet au pâturage dans les surfaces avec garrigue.

### 2) Disposition:

- Race ovine avec disposition à la production du lait et de la laine.

### 3) Caractères typiques:

- Taille: petite;
- Tête: légère, habituellement un peu allongée avec profil droit ou légèrement courbe dans les mâles, profil uniformément noir avec une expression de vivacité, de grands yeux lumineux avec un léger gonflement des paupières, les narines larges, une bouche ample. Pprésence fréquente de corne pour les deux sexes ; les pavillons auriculaires très petits ou absents
- Cou: bien uni aux épaules et à la poitrine, long et mince dans les filles, plus fort et plus robuste dans les mâles.
- Tronc: allongé et de forme tronc-conique, garrot bien serré légèrement prononcé et plutôt tranchant dans le mouton, plus musculeux dans le bélier; thorax profond et légèrement plat, épaules bien attachées ;; dos fort et droit; ligne supérieure correcte; lombes larges et

robustes alignés avec le dos, ventre capable, arrondi et bien modelé, hanches pleines, larges et profondeurs, croupe légèrement déclinante, plus longue que large, cuisse plate, décharnée et bien descendue.

- Queue mince et longue.
- Mamelles sphériques, large, bien soutenue, forte dans les attaques, avec tissage doux, spongieuse, élastique, presque flasque après la traite, bien baignée du périphérique sanguin courant et avec des mamelons proportionnés et bien directs
- Laine: noir, ouverte, constitué par flocons pointus, avec présence de poils morts dans le sous-poil, étendu jusqu'à moitié de l'avant-bras et peu sur le jarret.
- Peau et pigmentation: peau mince, élastique et de couleur noire, parfois avec des taches légèrement blanches ou marrons sur la tête, les membres, et, en général dans les parties dépourvues de laine.
- Défauts de zoognostiques que barrent l'inscription au Registre: laine merinisée, toison blanche ou marron, fécondité insuffisante, difficulté à la traite.

#### Caractères Biométriques et Reproductif:

Adult	Mâles	Femelles
Hauteur au garrot cm.	65	58
Hauteur au thorax cm.	28	24
Largeur moyen dos cm.	20	18
Longueur tronc cm.	63	60
Circonférence thoracique cm.	80	73
Poid Kg	46	35

Fertilité annuelle: à vérifier.

Prolificité: environ 120% en conditions extensives.

Fécondité annuelle: environ 110% en conditions extensives.

Race au polyestral continu avec un bref entracte d'anaestrus.

Âge moyen à l'accouchement premier: 15 mois.

- Caractères productifs:

Lait:

Lait (productions moyennes de race au net du lait tété par l'agneau):

Primipares: lt. 50,0 en 100 jours;

Secondipares: lt. 88,2 en 180 jours;

Multipares: lt. 98,0 en 180 jours;  
moyenne pour cent de graisse dans la lactation 6,5%;  
moyenne pour cent de protéines dans la lactation 5,6%.

Viande: poids moyen des sujets en Kg. , poids approché aux 100 gr.)

sex	Mis bas	AGE				
		Naissance	30 gg.	90 gg.	6 mois	1 an
Males	seul	3,2	9,8	17,0	30,3	40,0
femelles	seul	3,0	9,5	16,0	24,9	28,0

Laine: production moyenne :

- Béliers Kg. 2,0;
- Brebis Kg. 1,1;
- Qualité grossière; adapte pour textile, tapis et matelas .